



Tabelle 1: Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2020/2021

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren									
		6	2	3	4	5–10	11 <sup>*</sup>	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60	
			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1			J2			
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)																
Tetanus <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2			A <sup>e</sup>			
Diphtherie <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2			A <sup>e</sup>			
Pertussis <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>						A1		A2			A3 <sup>e</sup>			
Hib <sup>b</sup> H. influenzae Typ b		G1		G2		G3 <sup>c</sup>														
Poliomyelitis <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>							A1							
Hepatitis B <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>														
Pneumokokken <sup>b</sup>		G1		G2		G3 <sup>c</sup>											S <sup>g</sup>			
Meningokokken C							G1													
Masern							G1									S <sup>f</sup>				
Mumps, Röteln							G1													
Varizellen							G1													
HPV Humane Papillomviren													G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>						
Herpes zoster																			G1 <sup>h</sup>	G2 <sup>h</sup>
Influenza																			S	(jährlich)

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen  
 G Grundimmunisierung  
 (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)  
 A Auffrischimpfung  
 S Standardimpfung

- a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
  - b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
  - c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate
  - d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich
  - e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
  - f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
  - g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
  - h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden